KINOSTERNON SCORPIOIDES.

Testâ tricarinatâ, scutis vertebralibus elongatis, subimbricatis.

Testudo scorpioides. Linn. Syst. Nat. I. 352.—Daubent. Enc. Méth.—Lacép. Quad. Ovip. 133.—Latr. Rept. I. p. 19.
T. tricarinata. Daud. Rept. II. p. 178.
T. (Chersine) scorpioides. Merrem, Amph. 33.
T. pensylvanica, var. Shaw, Gen. Zool. III. pt. 1. t. 15. p. 61.
Emys scorpioidea. Schweig. sp. 35.
Kinosternon longicaudatum. Spix, Rept. Braz. t. xii. p. 17.—Bell, Zool. Journ. II. p. 304.
? *K. brevicaudatum.* Spix, l. c. t. xiii.—Bell, l. c. p. 304.
K. Shavianum. Bell, Zool. Journ. l. c.
Cinosternon scorpioides. Wagler, Amph. p. 137.
Kinosternon scorpioides. Gray, Syn. Rept. p. 34.
Junior. *Testudo tricarinata.* Schœpff, Hist. Test. t. ii. p. 9.—Latr. Hist. Rept. I. p. 118.—Shaw, Gen. Zool. III. p. 54. t. xi.
Testudo Retzii. Daud. l. c. p. 174.
Emys Retzii. Schweig. sp. 34.
Terrapene tricarinata. Merr. Amph. p. 28.

Habitat in Americâ meridionali.—In Mexico, Braziliâ, Surinamo, Guianâ; ad ripas fluminum.
Mus. nostr.—Mus. Brit., &c.

Descriptio. *Caput* ovatum, posticè latum, subdepressum, olivaceum, flavo virgillatum. *Maxillæ* denticulatæ, aduncæ, margine subsinuato. *Collum* olivaceo-fuscum, lineis flavis confluentibus, longitudinalibus. *Gula* cirrhis quatuor parvis armata, cinerascens. *Pedes* fusco-virides, squamati. *Ungues* breves, falciformes, acuti. *Cauda* crassa, conica, maris (?) brevis; fœminæ (?) longior, in nonnullis ungue corneo terminata,